

datam connatis, carinali longiore. Corolla rubra vel violacea (?); vexillum circ. 10 mm. long., extus villosum. Legumen ignotum.

OUEST : haut Bemarivo, bois rocailleux sur gneiss vers 800 m. alt. (Perrier 4842).

PONGAMIOPSIS R. Vig.

Arbores vel arbusculae. Folia imparipinnata foliolis multis parvis oppositis; stipulae deciduae. Racemi simplices, pauciflori, floribus oppositis. Calyx gamosepalus. Stamina diadelpha, vexillari basi libero sed ultra tubo partim adnato. Legumen ovatum vel oblongum, asymmetrum, deinde incrassatum, indehiscens, monospermum.

Dans ce genre rentrent :

P. Pervilleana (Baill.) R. Vig. comb. nov. (*Diphaca Pervilleana* Baill.).

OUEST : Ambongo et Boïna, bois sablonneux (Perrier 1344, 17849).

P. amygdalina (Baill.) R. Vig. comb. nov. (*Milletia amygdalina* Baill.).

OUEST : secteur nord, Boïna, Ambongo; rochers calcaires (Boivin 2714; Perrier 1801, 1828; Ursch 220 (?)).

(A suivre.)

UNE RUBIACÉE MALGACHE NOUVELLE DU GENRE « OTIOPHORA »

Par M^{me} LE GENISSEL-HOMOLLE.

Otiophora Perrieri Homolle spec. nov.

Herba repens valde pubescens ramis gracilibus subteretibus. Folia parva, subsessilia, opposita, limbo late ovato-cordiformi, apice acuminato, ad $1 \times 0,7\text{-}0,9$ cm., nervis lateralibus 3 utroque latere; stipulis in vaginam brevem, setoso ciliatam cum petiolis connatis. Flores axillares, in ramis axillaribus parvis foliatis ad apicem versus dispositi; calycis tubo obovoideo, limbo 5-dentato, dentibus 2 foliaceo-expansis; corolla hypocraterimorpha, tubo gracillimo, elongato, lobis 4, ovato-lanceolatis. Capsula pubescens ovoidea, calycis lobis coronata, 2-locularis, in coccos 2 indehiscentes secedens, 2-sperma. Semina erecta, oblonga.

MADAGASCAR : Domaine oriental, H. Perrier 3669 bis, Analamazaotra, bords de chemin.

Cette espèce, proche de l'*O. pauciflora*, s'en distingue par sa forte pubescence et par la forme de ses feuilles.